

## FICHE : SUITES RÉELLES

## 4 techniques de calcul de limites

- Par factorisation par les termes dominants
- Par multiplication par la quantité conjuguée
- Par utilisation du théorème de la limite séquentielle et par usage des limites usuelles.
- En utilisant les équivalents.

## Théorème d'opérations sur les limites

Soit  $(u_n)$  et  $(v_n)$  des suites convergent respectivement vers  $l$  et  $l'$ .

$$|u_n| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} |l|$$

$$\forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}, \quad \lambda u_n + \mu v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \lambda l + \mu l'$$

$$u_n v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} ll'$$

- Si  $l' \neq 0$ , on peut supposer qu'à partir d'un certain rang  $N$ , les termes de la suite  $(v_n)$  sont non nuls. Alors la suite  $(\frac{1}{v_n})_{n \geq N}$  est bien définie et de plus :

$$\frac{1}{v_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{l'}$$

$$\frac{u_n}{v_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{l}{l'}$$

## Théorème des gendarmes

On considère trois suites :  $(u_n)$ ,  $(v_n)$  et  $(w_n)$ . On suppose que :

- (H1)  $v_n \leq u_n \leq w_n$  à partir d'un certain rang.
- (H2) Les deux suites encadrantes  $(v_n)$  et  $(w_n)$  convergent vers une même limite  $l$

alors la suite  $(u_n)$  converge vers  $l$ .

De même, si :

- (H1)  $v_n \leq u_n$  à partir d'un certain rang.
- (H2)  $\lim v_n = +\infty$

alors  $\lim u_n = +\infty$ .

## Critère de divergence d'une suite

Soit  $(u_n)$  une suite réelle. On suppose qu'il existe deux suites extraites  $u_{\varphi(n)}$  et  $u_{\bar{\varphi}(n)}$  telles que :

$$(H1) \quad u_{\varphi(n)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} a \in \overline{\mathbb{R}}$$

$$(H2) \quad u_{\bar{\varphi}(n)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \bar{a} \in \overline{\mathbb{R}}$$

$$(H3) \quad a \neq \bar{a}$$

alors  $(u_n)$  est divergente.

## Théorème de la limite monotone

Soit  $(u_n)$  une suite réelle. On suppose que :

$$(H1) \quad (u_n) \text{ est croissante.}$$

$$(H2) \quad \text{Si } (u_n) \text{ est majorée par un réel } A \in \mathbb{R}$$

alors  $(u_n)$  converge vers une limite finie  $l \in \mathbb{R}$  et  $l \leq A$ .

## Suites adjacentes

Soient  $(u_n)$  et  $(v_n)$  deux suites réelles. On dit que  $(u_n)$  et  $(v_n)$  sont **adjacentes** lorsque :

$$(H1) \quad (u_n) \text{ est croissante}$$

$$(H2) \quad (v_n) \text{ est décroissante}$$

$$(H3) \quad v_n - u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

Ces deux suites sont convergentes et convergent vers la même limite  $l \in \mathbb{R}$ . De plus :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n \leq l \leq v_n$$

## Théorème de la limite séquentielle

Soient  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  et  $a \in \bar{I}$ . Soit une suite  $(u_n)$  de points de  $I$ . Soit  $l \in \bar{I}$ . On suppose que :

$$(H1) \quad u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} a$$

$$(H2) \quad f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} l$$

$$\text{alors } f(u_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} l.$$

## Convergence d'une suite géométrique

Soit  $(u_n)$  la suite géométrique de raison  $a \in \mathbb{R}$  et de premier terme 1 :  $\forall n, \quad u_n = a^n$ .

$$a^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \begin{cases} \text{diverge si } a \leq -1 \\ 0 \text{ si } a \in ]-1, 1[ \\ 1 \text{ si } a = 1 \\ +\infty \text{ si } a > 1 \end{cases}$$

### Suites négligeable devant une autre

**Définition :** Soient  $(u_n)$  et  $(v_n)$  deux suites. On dit que  $(u_n)$  est **négligeable** devant  $(v_n)$  lorsqu'il existe une suite  $(\varepsilon_n)$  **convergent vers 0** et un rang  $N \in \mathbb{N}$  tels que :

$$\forall n \geq N \quad u_n = \varepsilon_n v_n$$

Si tel est le cas, on note :

$$u_n = o_{n \rightarrow +\infty}(v_n)$$

**Proposition :** Soit  $(u_n)$  et  $(v_n)$  deux suites. On suppose que  $(v_n)$  ne s'annule pas à partir d'un certain rang. Alors :

$$u_n = o_{n \rightarrow +\infty}(v_n) \iff \frac{u_n}{v_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

### Croissances comparées

Soient  $a > 1$ ,  $\alpha > 0$  et  $\beta > 0$  alors :

$$(\ln n)^\beta = o_{n \rightarrow +\infty}(n^\alpha)$$

$$n^\alpha = o_{n \rightarrow +\infty}(a^n)$$

$$a^n = o_{n \rightarrow +\infty}(n!)$$

$$n! = o_{n \rightarrow +\infty}(n^n)$$

### Suites équivalentes

**Définition :** Soient  $(u_n)$  et  $(v_n)$  deux suites. On dit que  $(u_n)$  est **équivalente** à  $(v_n)$  lorsqu'il existe une suite  $(\alpha_n)$  **convergent vers 1** et un rang  $N \in \mathbb{N}$  tels que :

$$\forall n \geq N \quad u_n = \alpha_n v_n$$

Si tel est le cas, on note :

$$u_n \sim_{n \rightarrow +\infty} v_n$$

**Proposition :** Soient  $(u_n)$  et  $(v_n)$  deux suites. On suppose que  $(v_n)$  ne s'annule pas à partir d'un certain rang. Alors :

$$u_n \sim_{n \rightarrow +\infty} v_n \iff \frac{u_n}{v_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$$

### Opérations sur les équivalents

— Soit  $(a_n)$ ,  $(b_n)$ ,  $(c_n)$ ,  $(d_n)$  des suites telles que :

$$a_n \sim_{n \rightarrow +\infty} b_n \quad \text{et} \quad c_n \sim_{n \rightarrow +\infty} d_n$$

Alors :

$$a_n c_n \sim_{n \rightarrow +\infty} b_n d_n$$

Si de plus  $(c_n)$  et  $(d_n)$  ne s'annulent pas à partir d'un certain rang :

$$\frac{a_n}{c_n} \sim_{n \rightarrow +\infty} \frac{b_n}{d_n}$$

— Soit  $(u_n)$  et  $(v_n)$  deux suites et  $\alpha \in \mathbb{R}$ . Si les expressions  $u_n^\alpha$  et  $v_n^\alpha$  ont un sens à partir d'un certain rang, alors :

$$u_n \sim_{n \rightarrow +\infty} v_n \implies u_n^\alpha \sim_{n \rightarrow +\infty} v_n^\alpha$$

Par contre, il ne faut pas :

- Sommer des équivalents.
- Composer des équivalents. En particulier, il ne faut pas :
  - Prendre des logarithmes d'équivalents.
  - Prendre des exponentielles d'équivalents.

### Équivalents usuels

Soit  $(u_n)$  une suite telle que

$$u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

alors :

1  $\sin u_n \sim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

2  $\tan u_n \sim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

3  $\ln(1 + u_n) \sim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

4  $[1 - \cos u_n] \sim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n^2}{2}$

5  $[e^{u_n} - 1] \sim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

6  $[(1 + u_n)^\alpha - 1] \sim_{n \rightarrow +\infty} \alpha u_n \quad (\alpha \in \mathbb{R}^*)$

### Suites définies par récurrence

Soient  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$ ,  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  et  $a \in I$ . On suppose que  $I$  est un intervalle stable par  $f$ . On considère la suite

récurrenente  $(u_n)$  construite par  $\begin{cases} u_0 = a \\ \forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$

- Si  $f$  est croissante sur  $I$  alors  $(u_n)$  est monotone et :
  1. Si  $u_0 \leq f(u_0)$  alors  $(u_n)$  est croissante.
  2. Si  $u_0 \geq f(u_0)$  alors  $(u_n)$  est décroissante.
- Si  $f$  est décroissante sur  $I$  alors  $(u_n)$  a ses deux sous suites  $(u_{2n})$  et  $(u_{2n+1})$  monotones et de sens contraire.