Séries numériques

2.1 Sommes partielles et restes

Exercice 2.1.1 ★

Montrer que les séries suivantes convergent et calculer leur somme :

$$1. S_1 = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n(n+1)}, \quad 2. S_2 = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n(n+1)(n+2)}, \quad 3. S_3 = \sum_{n \geq 2} \ln\left(1 - \frac{1}{k^2}\right)$$

Exercice 2.1.2 ★

Indiquer la nature et, si elle existe, la somme de la série de terme général

$$u_n = \frac{1}{\sqrt{n} + \sqrt{n+1}}$$

Exercice 2.1.3 ★

Indiquer la nature et, si elle existe, la somme de la série de terme général

$$u_n = \frac{\sin \frac{1}{n(n+1)}}{\cos \frac{1}{n} \cos \frac{1}{n+1}}$$

Exercice 2.1.4 ★

On admet que $S_1 = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}$. Montrer que $\sum_{k \geq 1} \frac{1}{(2k+1)^2}$ est convergente et calculer sa somme S_2 .

Exercice 2.1.5 ★

Soit $z \in \mathbb{C}$ avec $|z| < 1$ et $p \in \mathbb{N}$. Après avoir prouvé sa convergence, calculer les sommes partielles et le reste de la série $\sum_{n \geq p} z^n$.

Exercice 2.1.6 ★

Soit $\alpha > 0$. Montrer que

$$\int_0^1 \frac{x^{\alpha-1}}{1+x} dx = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n+\alpha}$$

Exercice 2.1.7 ★

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

On considère la série de Riemann $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2}$ et on note $L = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$ sa somme. On veut trouver une valeur approchée de L à 10^{-p} près (p décimales exactes).

1. On décide de prendre comme valeur approchée de L , la somme partielle $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}$.

Écrire une procédure Python qui calcule S_n .

2. En utilisant une comparaison avec une intégrale, montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\frac{1}{n} - \frac{1}{n^2} \leq R_n \leq \frac{1}{n}$$

3. Combien de termes sommer pour obtenir une valeur approchée de L à 10^{-4} près ?

4. Trouver une amélioration de la méthode.

Exercice 2.1.8 ★

Pour $p \in \mathbb{N}$, on pose

$$a_p = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n^p}{2^n}$$

1. Montrer que a_p existe puis exprimer a_p en fonction de $a_0, \dots, a_{p-1}$.

2. En déduire que $a_p \in \mathbb{N}$.

Exercice 2.1.9 ★Existence et valeur pour $m \geq 1$ de

$$S_m = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+1)\dots(n+m)}.$$

2.2 Séries à termes positifs**Exercice 2.2.1** ★

Déterminer la nature des séries dont les termes généraux sont les suivants :

1. $u_n = \frac{n}{n^2+1}$,
2. $u_n = \frac{\operatorname{ch}(n)}{\operatorname{ch}(2n)}$,
3. $u_n = \frac{1}{\sqrt{n^2-1}} - \frac{1}{\sqrt{n^2+1}}$,
4. $u_n = e - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$,
5. $u_n = \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2}$,
6. $u_n = \frac{1}{n \cos^2 n}$.

Exercice 2.2.2 ★

Déterminer la nature des séries dont les termes généraux sont les suivants :

1. $u_n = \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}}$,
2. $u_n = \left(\frac{1}{n}\right)^{1+\frac{1}{n}}$,
3. $u_n = 2^{-\frac{1}{n}}$,
4. $u_n = \frac{1}{n} \ln\left(1 + \frac{1}{n^2}\right)$,
5. $u_n = \frac{1}{(\ln n)^2}$,
6. $u_n = e^{-\sqrt{n}}$.

Exercice 2.2.3 ★

Déterminer la nature des séries dont les termes généraux sont les suivants :

1. $u_n = \frac{1}{(\ln n)^n}$,
2. $u_n = \frac{n!}{n^n}$,
3. $u_n = \frac{n!}{a^n}$,
4. $u_n = \sin n$,
5. $u_n = \frac{2n}{n+2^n}$,
6. $u_n = \frac{1}{\sqrt{2n+1}}$.

Exercice 2.2.4 ★

Déterminer la nature des séries dont les termes généraux sont les suivants :

1. $u_n = \frac{1}{n^2} \sin \frac{\pi}{n}$,
2. $u_n = e^{\frac{1}{\sqrt{n+1}}} - 1$,
3. $u_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$,
4. $u_n = 1 - \cos \frac{1}{n}$,
5. $u_n = \frac{\sqrt{\ln(n+1)}}{\sqrt{\ln n + 1}}$,
6. $u_n = \frac{n^2+1}{n!}$.

Exercice 2.2.5 ★

Déterminer la nature des séries dont les termes généraux sont les suivants :

1. $u_n = \frac{n^3}{n!}$,
2. $u_n = \frac{\ln n}{2n^3-1}$,
3. $u_n = \frac{n+\sqrt{n}}{2n^3-1}$,
4. $u_n = \frac{\ln n}{n^2+3}$,
5. $u_n = e^{-n^2}$,
6. $u_n = \sin^3 \frac{1}{n}$.

Exercice 2.2.6 ★

Déterminer la nature des séries dont les termes généraux sont les suivants :

1. $u_n = (-1)^n \frac{\sin \sqrt{n}}{n^{3/2}}$,
2. $u_n = \frac{e^{-\sqrt{n}}}{\sqrt{n}}$,
3. $u_n = \frac{1}{n \ln n}$,
4. $u_n = (1 + \sqrt{n})^{-n}$,
5. $u_n = \frac{n^{\ln n}}{(\ln n)^n}$,
6. $u_n = \frac{a\sqrt{n}}{n^\alpha}$, $a > 0, \alpha > 0$.

Exercice 2.2.7 ★

Déterminer la nature des séries dont les termes généraux sont les suivants :

1. $u_n = \frac{1}{\sqrt{n} \cos^2 n}$,
2. $u_n = \sin \frac{1}{n} - \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$,
3. $u_n = \frac{1}{n^\alpha + \arctan n}$, $\alpha \in \mathbb{R}$,
4. $u_n = \frac{n+3}{n^2+n+1}$,
5. $u_n = \sin \frac{1}{2n}$,
6. $u_n = \frac{(n+2)^{4/3}}{(n+1)(n+3)^{3/2}}$;

Exercice 2.2.8 ★

Déterminer la nature des séries dont les termes généraux sont les suivants :

1. $u_n = \frac{4^n - n}{5^n + 2n^4}$,
2. $u_n = \frac{\ln n}{3n^4 - 2}$,
3. $u_n = \frac{2^n n!}{n^n}$,
4. $u_n = \ln \frac{n^4 + 3n^2 + n}{n^4 + 2n^2 - n + 1}$,
5. $u_n = \frac{\ln n}{n}$,
6. $u_n = \frac{1}{n \sin^2 n}$;

Exercice 2.2.9 ★

Déterminer la nature des séries dont les termes généraux sont les suivants :

1. $u_n = \frac{2^n n!}{n\sqrt{n}}$,
2. $u_n = \frac{n^{\ln n}}{(\ln n)^n}$,
3. $u_n = (\sqrt[n]{n} - 1)^\alpha$,
4. $u_n = \frac{\sqrt[3]{n^3 + n^2 + n + 1}}{\sqrt{n^2 + 1} + a + \frac{b}{n}}$,
5. $u_n = \ln\left(\frac{n^2 + an + 1}{n^2 + bn + 2}\right)$,
6. $u_n = \arccos\left(\frac{n}{n+1}\right)$.

Exercice 2.2.10 ★

Déterminer la nature des séries dont les termes généraux sont les suivants :

$$1. u_n = a^{\ln n}, a > 0,$$

$$3. u_n = n^{\frac{1}{n}} - n^{\frac{1}{n+1}},$$

$$5. u_n = \left(\cos \frac{1}{n}\right)^{n^\alpha},$$

$$2. u_n = \frac{(\ln n)^n}{n!},$$

$$4. u_n = (\ln(n+a))^\alpha - (\ln n)^\alpha, a > 0,$$

$$6. u_n = \frac{|\sin n| + |\cos n|}{n}.$$

Exercice 2.2.11 ★★★ **Type X**

Déterminer la nature des séries dont les termes généraux sont les suivants :

$$1. u_n = \frac{1}{n^\alpha} \sum_{k=1}^n \sqrt{k},$$

$$2. u_n = \frac{1}{n^\alpha} \sum_{k=1}^n (\ln k)^2,$$

$$3. u_n = \frac{1}{(n+p)!} \sum_{k=1}^n k! \text{ avec } p \geq 1.$$

On cherchera un équivalent de u_n

Exercice 2.2.12 ★

Déterminer la nature de la série de terme général

$$u_n = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^\alpha + n^\alpha}}$$

avec $\alpha > 0$.

Exercice 2.2.13 ★★

Étudier la convergence puis calculer la somme, quand celle-ci existe, de la série de terme général

$$u_n = \ln(n+1) + a \ln(n+2) + b \ln(n+3).$$

Exercice 2.2.14 ★

Trouver le polynôme P pour que la série de terme général

$$u_n = (n^4 + 2n^2)^{1/4} - (P(n))^{1/3}$$

soit convergente.

Exercice 2.2.15 ★

Pour quelles valeurs de α la série de terme général $u_n = (1+2+3+\dots+n)^\alpha$ est-elle convergente ?

Exercice 2.2.16 ★★

Soit (u_n) une suite réelle à termes positifs.

1. Montrer que les séries de terme général u_n , $v_n = \frac{u_n}{1+u_n}$ et $w_n = \ln(1+u_n)$ sont de même nature.

2. Si $\sum u_n$ converge, montrer que la série $\sum (u_n)^\alpha$, avec $\alpha \geq 1$, est aussi convergente.

Exercice 2.2.17 ★★

Soit (a_n) une suite de réels positifs.

1. On suppose que la série $\sum a_n$ converge. Quelle est la nature de la série de terme général :

$$(a) u_n = a_n^2;$$

$$(c) u_n = \sin\left(\frac{a_n}{1+a_n}\right).$$

$$(e) u_n = \frac{\sqrt{a_n}}{n-\sqrt{n}}.$$

$$(b) u_n = \frac{\sqrt{a_n}}{n};$$

$$(d) u_n = \frac{\sqrt{a_n}}{n+\sqrt{n}};$$

2. On suppose que la série $\sum a_n$ diverge. Quelle est la nature de la série de terme général :

$$(a) u_n = \frac{a_n}{1+n^2 a_n};$$

$$(b) u_n = \frac{a_n}{1+a_n}.$$

Exercice 2.2.18 ★ **Règle de Raabe-Duhamel**

Soient (u_n) et (v_n) deux suites de réels strictement positifs.

1. On suppose qu'à partir d'un certain rang

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \frac{v_{n+1}}{v_n}$$

Montrer que $u_n = o_{n \rightarrow +\infty}(v_n)$.

2. On suppose que

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = 1 - \frac{\alpha}{n} + o_{n \rightarrow +\infty}\left(\frac{1}{n}\right) \text{ avec } \alpha > 1$$

Montrer, à l'aide d'une comparaison avec une série de Riemann, que la série $\sum u_n$ converge.

3. On suppose cette fois-ci que

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = 1 - \frac{\alpha}{n} + o_{n \rightarrow +\infty}\left(\frac{1}{n}\right) \text{ avec } \alpha < 1$$

Montrer que la série $\sum u_n$ diverge

Exercice 2.2.19 ★

Déterminer la nature de la série de terme général

$$u_n = \begin{cases} 1/n & \text{si } n \text{ est un carré} \\ 1/n^2 & \text{sinon} \end{cases}$$

Exercice 2.2.20 ★

Soit $\sum u_n$ une série convergente et à terme général positif. Étudier la convergence de $\sum u_n^2$.

Exercice 2.2.21 ★★★ **Centrale PC**

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note $s(n)$ le nombre de chiffres de l'écriture décimale de n . Étudier la convergence et la somme de

$$\sum \frac{s(n)}{n(n+1)}.$$

Exercice 2.2.22 ★ **CCP MP**

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de réels strictement positifs et l un réel positif strictement inférieur à 1.

1. Démontrer que si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = l$, alors la série $\sum u_n$ converge.

Indication : écrire, judicieusement, la définition de $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = l$, puis majorer, pour n assez grand, u_n par le terme général d'une suite géométrique.

2. Quelle est la nature de la série $\sum_{n \geq 1} \frac{n!}{n^n}$?

Exercice 2.2.23 ★ **CCP MP**

1. Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites de nombres réels positifs. Montrer que :

$$u_n \underset{+\infty}{\sim} v_n \implies \sum u_n \text{ et } \sum v_n \text{ sont de même nature.}$$

2. Étudier la convergence de la série $\sum_{n \geq 2} \frac{(i-1) \sin\left(\frac{1}{n}\right)}{(\sqrt{n+3}-1) \ln n}$.

(i est ici le nombre complexe de carré égal à -1)

Exercice 2.2.24 ★

Soit $a \in \mathbb{R}$. Déterminer la nature de la série $\sum u_n$ où

$$u_n = \sqrt[3]{n^3 + an} - \sqrt{n^2 + 3}$$

stirling 1c

stirling 1d

Exercice 2.2.25 ★ **Oral CCP PC**

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose

$$a_n = \int_0^1 t^n \sqrt{1-t^2} dt.$$

stirling 1e

1. Calculer a_0 et a_1 .

2. (a) Montrer que (a_n) est décroissante.

(b) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, a_{n+2} = \frac{n+1}{n+4} a_n$.

(c) En déduire qu'au voisinage de $+\infty$, on a $a_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} a_{n+1}$.

3. (a) Montrer que la suite de terme général $n(n+1)(n+2)a_n a_{n-1}$ est constante.

(b) En déduire un équivalent de a_n au voisinage de $+\infty$ et la nature de la série $\sum_{n \geq 0} a_n$.

Exercice 2.2.26 ★★ **Intégrales de Wallis, Formule de Stirling**

Le but de cet exercice est de démontrer la formule de Stirling

$$n! \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$$

qui donne un équivalent de la factorielle.

1. Montrer que la suite de terme général

$$a_n = \frac{\sqrt{nn^n} e^{-n}}{n!}$$

converge vers une limite L non nulle.

Indication : Poser $u_n = \ln a_n$ puis considérer la série (v_n) de terme général $u_{n+1} - u_n$.

2. En déduire que $n! \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{L} \sqrt{nn^n} e^{-n}$.

3. L'objet de la suite du problème est de calculer L . Pour ce faire, on considère, pour n entier naturel, l'intégrale (dite de Wallis) définie par :

$$W_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n(t) dt$$

(a) Montrer que

$$\forall n \in \mathbb{N}, W_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n t dt.$$

(b) Calculer W_0 et W_1 .

(c) Montrer que

$$\forall n \in \mathbb{N}, W_{n+2} = \frac{n+1}{n+2} W_n$$

(d) En déduire, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$W_{2n} = \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2} \frac{\pi}{2} \text{ et } W_{2n+1} = \frac{2^{2n}(n!)^2}{(2n+1)!}.$$

(e) Montrer que (W_n) est décroissante et positive. En déduire que (W_n) est convergente.

(f) En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$1 \leq \frac{W_{n+1}}{W_{n+2}} \leq \frac{W_n}{W_{n+1}}.$$

(g) Montrer que $W_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} W_{n+1}$.

(h) Établir que pour tout $n \in \mathbb{N}, (n+1)W_{n+1}W_n = \frac{\pi}{2}$.

(i) En déduire que : $W_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \sqrt{\frac{\pi}{2n}}$.

4. En calculant, pour $n \in \mathbb{N}^*, \frac{a_{2n}}{a_n^2}$ et en faisant apparaître W_{2n} , calculer L et en déduire la formule de Stirling.

Exercice 2.2.27 ★★ **Mines PC 2003**

Quelle est la nature de la série de terme général $u_n = \int_0^{+\infty} e^{-nx} \arctan x dx$.

Exercice 2.2.28 ★★★ **Centrale MP**

Pour $\alpha > 1$, on pose

$$S_N = \sum_{n=1}^N \frac{1}{n^\alpha} \quad \text{et} \quad R_N = \sum_{n=N+1}^{+\infty} \frac{1}{n^\alpha}$$

Étudier la nature de la série $\sum_{n \geq 1} \frac{R_n}{S_n}$ selon la valeur du réel α .

Exercice 2.2.29 ★★★ **X PC 2017**

Soi (a_n) une suite réelle. On suppose que $a_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \alpha \ln n$ où $\alpha > 0$

1. Montrer que la série de terme général e^{-a_n} converge si $\alpha > 1$ et diverge si $\alpha < 1$.
2. Peut-on conclure quand $\alpha = 1$?

Exercice 2.2.30 ★★★ **X PC 2017**

Étudier la nature de la série de terme général

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad u_n = \frac{(-1)^{\frac{n(n+1)}{2}}}{\sqrt{n(n+1)}}.$$

Exercice 2.2.31 ★★★ **X PC 2016**

Soit (a_n) une suite croissante de réels strictement positifs. On suppose que (a_n) diverge vers $+\infty$. Quelle est la nature de la série de terme général $\frac{a_n - a_{n-1}}{a_n}$?

Exercice 2.2.32 ★★★ **X PC 2016**

Soit (u_n) une suite de réels positifs. On suppose que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \sum_{k=n+1}^{2n} u_k \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n u_k$$

Montrer que la série de terme général u_n converge.

Exercice 2.2.33 ★

On considère la suite réelle (u_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ par :

$$u_n = \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{(-1)^{k-1}}{\sqrt{k}} \right).$$

1. Justifier que : $\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad u_n > 0$.
2. Montrer que : $\forall k \geq 1, \quad \frac{1}{k+1} \leq \ln(k+1) - \ln(k) \leq \frac{1}{k}$.
3. On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ et $a_n = H_n - \ln(n)$.
 - (a) Montrer que : $\forall n \geq 1, \quad a_n > 0$.
 - (b) Montrer que la suite (a_n) converge vers un réel $\gamma \in [0, 1]$.
4. (a) Montrer l'égalité :

$$\ln(u_n) = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{\sqrt{k}} - \frac{1}{2} H_n + \sum_{k=1}^n w_k$$

où $\sum_{k \geq 1} w_k$ est une série convergente.

(b) Déterminer $\lim u_n$. Quelle est la nature de la série $\sum_{n \geq 1} u_n$.

5. Pour $\alpha > 0$, on considère la suite (v_n) définie par

$$v_n = \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{(-1)^{k-1}}{k^\alpha} \right).$$

Montrer que cette suite admet une limite finie V , puis que $V = 0$ si et seulement si $\alpha \leq \frac{1}{2}$.

Exercice 2.2.34 ★ **C.C.P. - P.C. 2014**

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \frac{2n+2}{2n+5} u_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Étudier la convergence de la suite (u_n) .
2. On pose $v_n = \left(\frac{n+1}{n}\right)^{3/2} \frac{u_{n+1}}{u_n}$. Déterminer $a > 0$ tel que

$$\ln(v_n) = \frac{a}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

3. La série $\sum \ln(v_n)$ est-elle convergente ?
4. Montrer qu'il existe $C > 0$ tel que $u_n \sim \frac{C}{n^{3/2}}$.
5. La série $\sum u_n$ est-elle convergente ?

Exercice 2.2.35 ★ **X PC 2017**

Indiquer la nature des séries :

$$\sum_{n \geq 2} \frac{1}{\ln n} \quad \text{et} \quad \sum_{n \geq 2} \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}}.$$

Exercice 2.2.36 ★ **Mines PC 2017**

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in (\mathbb{R}_+^*)^{\mathbb{N}}$ une suite réelle strictement positive. On suppose qu'il existe $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = 1 - \frac{\alpha}{n} + o\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

On pose aussi pour tout $n \in \mathbb{N}$, $b_n = \ln(n^\alpha u_n)$ et $a_n = b_{n+1} - b_n$.

1. Quelle est la nature de la série $\sum_{n \geq 0} a_n$?
2. Montrer que $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{\lambda}{n^\alpha}$ avec $\lambda > 0$ à déterminer.
3. Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $I_n = \int_0^{+\infty} \frac{t^2}{(1+t^4)^n} dt$. Trouver une relation de récurrence entre I_n et I_{n+1} .
4. Trouver un équivalent de I_n .

Exercice 2.2.37 ★★★ **Centrale, X - P.C. 2014**

1. Justifier la convergence de la série de terme général $u_n = \frac{1}{(8n+1)(8n+5)}$.
2. Exprimer la somme de cette série à l'aide d'une intégrale.

2.3 Comparaison série-intégrale

Exercice 2.3.1 ★ Constante d'Euler

Montrer qu'il existe un réel γ (appelé constante d'Euler) tel que

$$H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \ln n + \gamma + o(1)$$

Exercice 2.3.2 ★

Étudier la nature de la série $\sum \frac{1}{n(\ln n)^\beta}$ où $\beta > 0$.

Exercice 2.3.3 ★ Série de Bertrand

Étudier la nature de la série de Bertrand : $\sum \frac{1}{n^\alpha (\ln n)^\beta}$ où $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

Exercice 2.3.4

Étudier la nature de la série de terme général $u_n = \frac{1}{n \ln n (\ln(\ln n))^2}$.

Exercice 2.3.5 ★ Équivalent du reste de la série de Riemann

1. Montrer que si $0 < \alpha < 1$ alors $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^\alpha} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{n^{1-\alpha}}{1-\alpha}$.
2. Déterminer un encadrement puis un équivalent du reste d'ordre n de la série de Riemann $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\alpha}$ pour $\alpha > 1$.
3. Application : donner la nature de la série de terme général $u_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^2}$ puis celle de la série de terme général $v_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^4}$.

Exercice 2.3.6 ★★ Mines-Pont PC

Indiquer la nature de $\sum u_n$ si

$$u_n = \arccos\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) - \arccos\left(\frac{1}{\sqrt{n+1}}\right)$$

sans utiliser un télescopage.

Exercice 2.3.7 ★ CCP MP

1. On considère la série de terme général $u_n = \frac{1}{n(\ln n)^\alpha}$ où $n \geq 2$ et $\alpha \in \mathbb{R}$.

(a) Cas $\alpha \leq 0$

En utilisant une minoration très simple de u_n , démontrer que la série diverge.

(b) Cas $\alpha > 0$

Étudier la nature de la série.

Indication : On pourra utiliser la fonction f définie par $f(x) = \frac{1}{x(\ln x)^\alpha}$.

2. Déterminer la nature de la série $\sum_{n \geq 3} \frac{\left(e - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right) e^{\frac{1}{n}}}{(\ln(n^2 + n))^2}$.

Exercice 2.3.8 ★ Centrale PC 2001

Quelle est la nature de la série de terme général

$$u_n = \frac{\sqrt{1} + \sqrt{2} + \dots + \sqrt{n}}{n^a}$$

où $a \in \mathbb{R}$.

Exercice 2.3.9 ★★

Quelle est la nature de la série de terme général

$$u_n = n^a \sum_{k=n}^{+\infty} \frac{1}{k^2}$$

où $a \in \mathbb{R}$.

Exercice 2.3.10 ★ CCP 2011

Pour $n \geq 2$, on pose :

$$u_n = \sum_{k=2}^n \ln^2 k.$$

1. Montrer que $\sum_{n \geq 2} u_n$ diverge.
2. Montrer que :

$$\int_1^n \ln^2 t dt \leq u_n \leq \int_2^{n+1} \ln^2 t dt.$$

3. Calculer $\int_1^x \ln^2 t dt$ et en déduire que :

$$\int_1^n \ln^2 t dt \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} n \ln^2 n.$$

4. Donner un équivalent de $\frac{1}{u_n}$ quand $n \rightarrow +\infty$.
5. Quelle est la nature de la série $\sum \frac{1}{u_n}$?

Exercice 2.3.11 ★

Pour $\alpha > 1$ on pose

$$\zeta(\alpha) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^\alpha}$$

Déterminer la limite de $(\alpha - 1)\zeta(\alpha)$ quand α tend vers 1^+

Exercice 2.3.12 ★

En exploitant une comparaison avec des intégrales, établir :

1. $\sum_{k=1}^n \sqrt{k} \sim \frac{2}{3} n \sqrt{n}$

2. $\ln(n!) \sim n \ln n$

3. $\sum_{k=2}^n \frac{1}{k \ln k} \sim \ln(\ln n)$

Exercice 2.3.13 ★★★ Centrale MP

Soit $a > 0, b > 0$ et pour $n \in \mathbb{N}^*$,

$$A_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (a + bk), B_n = \prod_{k=1}^n (a + bk)^{1/n}$$

Trouver $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{B_n}{A_n}$ en fonction de e .

Exercice 2.3.14 ★ Mines MP

Nature de la série de terme général

$$\frac{n^\alpha}{\sum_{k=2}^n \ln^2 k}$$

où α est réel.

Exercice 2.3.15 ★ Mines MP

Soit $\alpha \in \mathbb{R}^*$. On pose, pour $n \in \mathbb{N}^*$

$$u_n = \frac{1}{\sum_{k=1}^n k^\alpha}$$

Nature de la série de terme général u_n ?

Exercice 2.3.16 ★★★ Mines PC 2017

Déterminer un équivalent de $\sum_{k=1}^{2n-1} \frac{1}{2k+1}$.

2.4 Critère de d'Alembert

Exercice 2.4.1 ★

Nature de la série $\sum \frac{n!}{n^n}$.

Exercice 2.4.2 ★

Nature de la série $\sum \frac{\binom{2n}{n}}{2^n}$.

Exercice 2.4.3 ★★

Nature de la série $\sum \frac{n^\alpha}{(1+a)(1+a^2)\dots(1+a^n)}$ où $a > 0$ et $\alpha \in \mathbb{R}$.

Exercice 2.4.4 ★

Nature de la série $\sum u_n$ où

$$u_n = \begin{cases} \frac{1}{2^n} & \text{si } n \text{ est pair} \\ \frac{1}{3^n} & \text{si } n \text{ est impair} \end{cases}$$

Exercice 2.4.5 ★★ Règle de Cauchy

On considère une série à termes positifs $\sum u_n$. On suppose que

$$\sqrt[n]{u_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} l$$

En utilisant une série géométrique, montrer la règle de Cauchy :

1. Si $0 \leq l < 1$, alors $\sum u_n$ converge.
2. Si $l > 1$, alors $\sum u_n$ diverge.

Exercice 2.4.6 ★ Règle de Raabe-Duhamel, preuve avec le critère de comparaison logarithmique

Soit une série $\sum u_n$ à termes strictement positifs. On suppose que :

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = 1 - \frac{\alpha}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$$

1. Si $\alpha < 1$, montrer que la série $\sum u_n$ diverge.
2. Si $\alpha > 1$, montrer que la série $\sum u_n$ converge.

On utilisera le théorème de comparaison logarithmique avec une série de Riemann. Ce résultat s'appelle la règle de Raabe-Duhamel qui est hors-programme mais qu'il faut savoir retrouver.

2.5 Quotient terme sur somme

Exercice 2.5.1 ★ Mines MP

Soit (u_n) une suite réelle strictement positive et convergeant vers 0. On pose

$$v_n = \frac{u_{n+1}}{S_n} \text{ avec } S_n = \sum_{k=0}^n u_k.$$

Montrer que les séries $\sum u_n$ et $\sum v_n$ ont même nature.

Indication 2.0 : On pourra montrer que $v_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \ln(S_{n+1}) - \ln(S_n)$

Exercice 2.5.2 ★★★ X MP

Soit $(u_n)_{n \geq 1}$ une suite de réels strictement positifs.

On pose, pour $n \in \mathbb{N}^*, v_n = \frac{u_n}{S_n}$ où $S_n = u_1 + \dots + u_n$. Déterminer la nature de $\sum v_n$.

Exercice 2.5.3 ★ CCP MP, Mines PC 2017

Soit (a_n) une suite de réels strictement positifs et $S_n = \sum_{k=0}^n a_k$.

1. On suppose que la série $\sum a_n$ converge, donner la nature de $\sum a_n/S_n$.
2. On suppose que la série $\sum a_n$ diverge, montrer

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \frac{a_n}{S_n^2} \leq \frac{1}{S_{n-1}} - \frac{1}{S_n}$$

En déduire la nature de $\sum a_n/S_n^2$.

3. On suppose toujours la divergence de la série $\sum a_n$. Quelle est la nature de $\sum a_n/S_n$?

2.6 Série dont le terme est défini par récurrence

Exercice 2.6.1 ★★

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 \in [0, \pi]$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} = 1 - \cos u_n$$

Montrer que $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$ et déterminer la nature de la série de terme général u_n .

Exercice 2.6.2 ★★★

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 > 0$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} = \sqrt{1 + u_n}$$

Montrer que (u_n) converge vers un réel ℓ .

Quelle est la nature de la série de terme général $u_n - \ell$?

Exercice 2.6.3 ★★

Soit (x_n) la suite de nombres réels donnée par :

$$\begin{cases} x_0 &= 1 \\ x_{n+1} &= \ln(e^{x_n} - x_n) \quad \text{si } n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

1. Montrer que (x_n) est bien définie.
2. Montrer que la série $\sum_{n \in \mathbb{N}} x_n$ converge et calculer sa somme.

Exercice 2.6.4 ★★ Centrale PC 2017

Soit (a_n) la suite définie par :

$$\begin{cases} a_0 &= 1 \\ a_{n+1} &= \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n \frac{a_k}{n-k+2} \quad \text{si } n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

Montrer que la série $\sum_{n \geq 2} \frac{a_k}{2^k}$ est convergente et calculer sa somme.

Exercice 2.6.5 ★★★ X PC 2016

Soit (a_n) la suite définie par :

$$\begin{cases} a_0 &= 1 \\ a_{n+1} &= 2a_{\lfloor n/2 \rfloor} \quad \text{si } n \in \mathbb{N}, n \geq 2 \end{cases}$$

1. Montrer que cette suite est bien définie.
2. Montrer que la série de terme général $\frac{1}{a_n^2}$ est convergente et calculer sa somme.

Exercice 2.6.6 ★★★ X PC 2017

Soit (a_n) la suite définie par :

$$\begin{cases} a_0 &= 1 \\ a_{n+1} &= \ln(e^{a_n} - a_n) \quad \text{si } n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

1. Montrer que cette suite est bien définie.
2. Montrer que la série de terme général a_n est convergente et calculer sa somme.

Exercice 2.6.7 ★★★ X - P.C. 2012

Soit $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+^*$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ vérifiant $f(0) = 1$ et $f'(x) < 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. On définit une suite (a_n) par

$$\begin{cases} a_0 &= 1 \\ a_{n+1} &= a_n f(a_n) \quad \text{si } n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

1. Déterminer la limite éventuelle de la suite (a_n) .
2. Nature de la série de terme général a_n ?

Exercice 2.6.8 ★ X-ESPCI 2018

Soit (u_n) la suite définie par :

$$\begin{cases} u_0 &\in \mathbb{R}_+^* \\ \forall n \in \mathbb{N}, &u_{n+1} = u_n e^{-u_n} \end{cases}$$

1. Montrer que (u_n) est convergente ;
2. Calculer sa limite.
3. Quelle est la nature de $\sum_{n \geq 0} u_n$?

Exercice 2.6.9 ★★★

Soit $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ telle que $f > 0$, $f' < 0$, $f(0) = 1$. Soit $(x_n)_{n \geq 0}$ une suite définie par $x_0 \in \mathbb{R}^{+*}$ et, pour $n \in \mathbb{N}$, $x_{n+1} = x_n f(x_n)$.

- a) Étudier la suite (x_n) .
- b) Déterminer la nature de la série de terme général x_n .

2.7 Critère spécial

Exercice 2.7.1 ★

Pour chacune des séries suivantes, justifier la convergence et, S désignant la somme de la série, préciser pour les trois premières n tel que $|S_n - S| \leq 10^{-2}$. En déduire un encadrement de S à 10^{-2} près.

- $u_n = \frac{(-1)^n}{n+2}$,
- $u_n = \frac{(-1)^n}{2n^3+1}$,
- $u_n = \frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt{n}}$,
- $u_n = \frac{(-1)^n}{n^2+1}$,
- $u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}}$,
- $u_n = \ln\left(1 + \frac{(-1)^n}{n+1}\right)$

Exercice 2.7.2 ★

Déterminer la nature des séries dont les termes généraux sont les suivants :

- $u_n = \cos\left(\pi\sqrt{n^2+n+1}\right)$
- $u_n = \sin\left(n\pi + \frac{\pi}{n}\right)$
- $u_n = \cos\left(n^2\pi \ln\left(1 - \frac{1}{n}\right)\right)$
- $u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+(-1)^n}}$
- $u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}}$
- $u_n = \ln\left(1 + \frac{(-1)^n}{\sqrt{n(n+1)}}\right)$

Exercice 2.7.3 ★

Étudier la convergence et la convergence absolue des séries de terme général :

- $u_n = \frac{(-1)^n}{n \ln n}$,
- $u_n = (-1)^n \frac{\ln n}{n^\alpha}$,
- $u_n = \frac{(-1)^n}{n^\alpha + (-1)^n n^\beta}$, $\alpha \neq \beta$,
- $u_n = \ln\left(1 + \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}} + \frac{a}{n}\right)$,
- $u_n = \sin\left(\pi\sqrt{n^2+an+2}\right)$,
- $u_n = \int_{n\pi}^{n\pi+\pi/2} \frac{\sin t}{(1+t)^\alpha} dt$, avec $\alpha > 0$
- $u_n = (-1)^n \frac{P(n)}{Q(n)}$, P et Q deux polynômes,
- $u_n = \cos\left(\pi n^2 \ln\left(\frac{n+1}{n+2}\right)\right)$.

Exercice 2.7.4 ★

Étudier la convergence de $\sum (-1)^n x^n$ pour $x \in]-1, 1[$.

Exercice 2.7.5 ★

Montrer que

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n 8^n}{(2n)!}$$

est un réel négatif.

Exercice 2.7.6 ★

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. Déterminer la nature de la série de terme général

$$u_n = (-1)^n n^\alpha \left(\frac{1}{n} - \sin \frac{1}{n}\right).$$

Exercice 2.7.7 ★

TPE PSI 2016

Soit $\alpha > 0$. Étudier la nature de la série de terme général

$$u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n^\alpha + (-1)^n}}$$

Exercice 2.7.8 ★ **Intégrale de Dirichlet**

On rappelle la convergence de l'intégrale de Dirichlet

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$$

En observant que

$$I = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \int_0^\pi \frac{\sin t}{n\pi+t} dt,$$

déterminer le signe de I.

Exercice 2.7.9 ★ **Oral Mines-Pont PC**

Nature de la série de terme général $u_n = \cos\left(\pi\sqrt{n^2+n+n^{1/3}}\right)$.

Exercice 2.7.10 ★ **Important : à retrouver par vous-même**

- Montrer que la série harmonique alternée $\sum \frac{(-1)^n}{n}$ est semi-convergente, et montrer que

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} = \ln 2$$

Donner une majoration du reste R_n de cette série.

- Calculer $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$.

Exercice 2.7.11 ★ **Mines 2013**

Étudier la nature de la série de terme général

$$u_n = \ln\left(\tan\left(\sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{2k+1}\right)\right).$$

Exercice 2.7.12 ★

Étudier la nature de la série de terme général

$$u_n = \frac{1}{n} \sum_{k=n}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{k}.$$

Exercice 2.7.13 ★★★ **Centrale PSI**

On pose

$$s_n = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k+1}}{k} \quad \text{et} \quad u_n = \ln(e^{s_n} - 1).$$

- Énoncer le théorème des séries spéciales alternées, en faire la preuve.
- Prouver que les suites $(s_n)_{n \geq 1}$ et $(u_n)_{n \geq 1}$ convergent.
- Étudier la nature de $\sum u_n$.

Exercice 2.7.14 ★

Soit $x \in \mathbb{R}$. Quelle est la nature de la série de terme général $u_n = \sin\left(\pi\sqrt{n^2 + x^2}\right)$?

Exercice 2.7.15 ★ C.C.P. – P.C. 2014

Soit $f: \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$ décroissante, à valeurs positives de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$. On suppose que f a une limite nulle en $+\infty$ et que f' est croissante. On définit

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = \sum_{p=n+1}^{+\infty} (-1)^p f(p).$$

- Vérifier que (u_n) est bien définie.
- On pose $a_p = f(p) - f(p+1)$ pour tout $p \in \mathbb{N}^*$. Montrer que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \sum_{p=n+1}^{+\infty} (-1)^p a_p = 2u_n - (-1)^{n+1} f(n+1).$$

- Montrer que $(a_p)_{p \in \mathbb{N}^*}$ est décroissante.
- Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer que :

$$\left| \sum_{p=n+1}^{+\infty} (-1)^p a_p \right| \leq f(n+1) - f(n+2).$$

- En déduire que $\sum u_n$ est convergente.
- On suppose dorénavant que $f: x \mapsto \frac{1}{x}$.
 - Montrer que $u_n = (-1)^{n+1} \int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx$ pour $n \in \mathbb{N}$.
 - En déduire $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$.

Exercice 2.7.16 ★★★ Mines-Pont – P.C. 2014, X – P.C. 2007-2009

Soit $p \in \mathbb{N}^*$. Nature de la série de terme général

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = \sin^p(n! \pi e).$$

Exercice 2.7.17 ★★★ X – P.C. 2014

Nature de la série de terme général $u_n = \sin(\pi\sqrt{1+n^2})$.

2.8 Suites et séries

Exercice 2.8.1 ★ Constante d'Euler

On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ de terme général

$$u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n.$$

- Montrer que la suite (u_n) converge en passant par une série.
- Montrer que la suite (u_n) converge en utilisant une méthode élémentaire. La limite de cette suite est notée γ et est appelée constante d'Euler.
- Trouver une valeur approchée de γ grâce à votre calculatrice.
- La convergence de la suite (u_n) vers γ est-elle rapide ? (On pourra montrer que $\gamma - u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{2n}$.)

Exercice 2.8.2 ★

Démontrer la convergence de la suite de terme général

$$u_n = \frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}} - 2\sqrt{n}.$$

Exercice 2.8.3 ★

Étudier la convergence de la suite de terme général

$$u_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k(k+1)}.$$

Exercice 2.8.4 ★★★

Étudier, à l'aide d'une série, la nature des suites de terme général u_n suivantes :

- $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n$ (on note γ sa limite);
- $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{\ln k}{k} - \frac{1}{2} (\ln n)^2$;
- $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2k+1} - a \ln n$ (En cas de convergence, exprimer la limite à l'aide de γ).

Exercice 2.8.5 ★

Calculer la limite de

$$u_n = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} - \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{n^2} \right)$$

Exercice 2.8.6 ★

On pose

$$a_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{3n}$$

- Montrer que la suite (a_n) converge et trouver sa limite λ .
- Trouver un équivalent simple de $a_n - \lambda$.

Exercice 2.8.7 ★

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, soit

$$u_n = \frac{(2n)!}{(2^n n!)^2}$$

1. Déterminer un équivalent de

$$\ln u_{n+1} - \ln u_n$$

exo:2004:Oct:Fri:11:04:41

En déduire que $u_n \rightarrow 0$.

2. En s'inspirant de ce qui précède, établir que $\sqrt{n}u_n \rightarrow C > 0$ (on ne cherchera pas expliciter la valeur de C).

Exercice 2.8.8 ★★★ X MP

Soit (u_n) une suite complexe telle que pour tout $p \in \mathbb{N}^*$, $u_{pn} - u_n \rightarrow 0$. Peut-on affirmer que la suite (u_n) converge ?

exo:2005:Jan:Tue:22:30:28

Exercice 2.8.9 ★★★ X MP

Étudier la limite quand $n \rightarrow +\infty$ de

$$\sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n}\right)^n$$

2.9 Calculs de somme de séries

Exercice 2.9.1 ★★★ Centrale PC 2005

Soit $a \in \mathbb{R}_+ \setminus \{1\}$. On pose

$$u_n = \frac{a^{2^n}}{\prod_{k=0}^n (a^{2^k} + 1)}.$$

1. Discuter suivant la valeur de a la nature de $\sum u_n$.
2. Lorsque la série converge, calculer sa somme.

Indication 2.0 : Montrer que $u_n = \alpha_{n-1} - \alpha_n$ où (α_n) est une suite à déterminer.

Exercice 2.9.2 ★ Mines 2007

1. Étudier la convergence et calculer la somme de $\sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{2n+1}$ en remarquant que $\frac{1}{2n+1} = \int_0^1 t^{2n} dt$.
2. Même question avec $\sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{3n+1}$.

2.10 Produit de Cauchy de deux séries

Exercice 2.10.1 ★

On considère la série $\sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}}$.

1. Étudier sa convergence et sa convergence absolue.
2. Soient $a < b$. Majorer simplement $(x-a)(b-x)$ pour $x \in [a, b]$.
3. Montrer que le produit de Cauchy de cette série par elle-même est une série divergente.

Exercice 2.10.2 ★★★

On considère la série $\sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{n+1}$.

1. Convergence de cette série ?
2. Montrer que le produit de Cauchy de cette série par elle-même est une série convergente.

Exercice 2.10.3 ★

Soit $z \in \mathbb{C}$. Montrer que

$$\left(1 + \frac{z}{n}\right)^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} e^z$$

Exercice 2.10.4 ★

Indiquer la nature et éventuellement la somme de la série de terme général

$$u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2 2^{n-k}}$$

Exercice 2.10.5 ★

1. Prouver la convergence et calculer la somme de la série de terme général

$$w_n = \sum_{p=1}^n \frac{1}{p^2 (n-p)!}.$$

2. Faire de même avec la série de terme général

$$w_n = \sum_{p=1}^{n-1} \frac{1}{p^2 (n-p)^2}$$

en admettant que $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$.

Exercice 2.10.6 ★

On considère les suites (a_n) et (b_n) données par $a_0 = b_0 = 0$ et $\forall n \geq 1$, $a_n = b_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$. Montrer que $\sum a_n$ et $\sum b_n$ sont convergentes mais que leur produit de Cauchy est une série divergente.

2.11 Formule de Stirling

Exercice 2.11.1 ★

Trouver un équivalent de

$$u_n = \frac{\binom{2n}{n}}{2^{2n}(2n-1)}.$$

Peut-on retrouver ce résultat à l'aide du critère de d'Alembert.

Exercice 2.11.2 ★ Étudier la limite de $\frac{(2n)!}{n^n n!}$ ainsi que la convergence de la série $\sum_{n \geq 1} \frac{n!}{n^n}$.

Exercice 2.11.3 ★ Étudier suivant les valeurs de $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$ la nature de la série de terme général $u_n = \frac{(3n)!}{\alpha^{3n} (n!)^3}$.

3. En remarquant de $\cos(n\theta) = S_n - S_{n-1}$, étudier la convergence de la série de terme général

$$u_n = \frac{\sqrt{n}}{n-1} \cos(n\theta)$$

4. En utilisant $|\cos(k\theta)| \geq \cos^2(k\theta)$, étudier la convergence de $\sum |u_n|$.

2.12 Transformation d'Abel

Exercice 2.12.1 ★ Transformation d'Abel Soient (a_n) une suite positive décroissante de limite nulle et (S_n) une suite bornée.

1. Montrer que la série $\sum (a_n - a_{n+1})S_n$ est convergente.
2. En déduire que la série $\sum a_n(S_n - S_{n-1})$ est convergente.
3. Établir que pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus 2\pi\mathbb{Z}$, la série $\sum \frac{\cos(nx)}{n}$ est convergente.

Exercice 2.12.2 ★ Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose

$$\Sigma_n = \sum_{k=1}^n \sin k \quad \text{et} \quad S_n = \sum_{k=1}^n \frac{\sin k}{k}.$$

1. Montrer que $(\Sigma_n)_{n \geq 1}$ est bornée.
2. En déduire que $(S_n)_{n \geq 1}$ converge.

Exercice 2.12.3 ★ ENSTIM Soit $\theta \in \mathbb{R}$ non multiple de 2π . On pose

$$S_n = \sum_{k=0}^n \cos(k\theta) \quad \text{et} \quad u_n = \frac{\cos(n\theta)}{n}.$$

1. Montrer que la suite $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée.
2. En observant que $\cos(n\theta) = S_n - S_{n-1}$, établir que la série de terme général u_n converge.
3. En exploitant l'inégalité $|\cos x| \geq \cos^2 x$, établir que la série de terme général $|u_n|$ diverge.

Exercice 2.12.4 ★ CCP MP

1. Montrer l'existence, pour $\theta \in]0, \pi[$, d'un majorant M_θ de la valeur absolue de

$$S_n = \sum_{k=1}^n \cos(k\theta).$$

2. Montrer que $x \mapsto \frac{\sqrt{x}}{x-1}$ est décroissante sur $[2, +\infty[$.